



Катар мочевого пузыря

Воспалительное заболевание нижнего мочевыводящего тракта, вызванное бактериями.

Возникновение

В случае не отягощённой осложнениями инфекции мочевыводящих путей у женщин, называемой в просторечии воспалением или катаром мочевого пузыря (циститом) , речь идёт о часто возникающем заболевании, которым страдает в среднем каждая пятая женщина. У женщин, по сравнению с мужчинами, очень короткий мочеиспускательный канал (уретра), около 3 см, именно это является одной из причин лёгкого проникновения бактерий в мочевой пузырь. Этим заболеванием страдают обычно женщины, находящиеся в возрасте половой активности и пожилые женщины после наступления менопаузы (из-за недостатка эстрогена). Эта инфекция известна (в западном мире) как инфекция « медового месяца» , так как она развивается часто непосредственно после полового акта.

Мы говорим о не отягощённой осложнениями инфекции мочевыводящих путей, если исключаются факторы, способствующие развитию воспаления, и не задействованы мочеточники и почки. В противном случае, речь идёт уже об отягощённой осложнениями инфекции, нуждающейся в более длительном лечении и, если причины ещё не выяснены, в их выявлении.

Профилактика

- достаточное количество потребляемой жидкости в день (около 2 л);
- избегание переохлаждений , например, из-за мокрой пляжной одежды;
- опорожнение мочевого пузыря после полового акта;

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



- фруктовые соки (брусничный, клюквенный) и препараты, создающие или поддерживающие кислую среду мочи, необходимую для предупреждения возможных инфекций.

Симптомы

- от лёгкого жжения при мочеиспускании до неконтролируемых позывов к мочеиспусканию;
- короткие интервалы между опорожнениями мочевого пузыря с всё уменьшающимся количеством мочи;
- боли и повышенная температура;
- нередко присутствие крови в моче.

Диагностика

Исследование мочи экспресс- методом выявляет наличие лейкоцитов (клетки воспалительного процесса), а также бактерий. Для идентификации бактерий, явившихся причиной воспаления, проводится бактериальное исследование (посев мочевой культуры). После этого существует возможность тестирования выявленного типа бактерий на различные антибиотики с целью определения стратегии медикаментозного лечения. Почки и мочевой пузырь обследуются посредством ультразвукового обследования (УЗИ).

Терапия

Боли внизу живота, носящие характер спазмов, можно ослабить тепловыми процедурами. Вызванное бактериями воспаление мочевого пузыря нуждается в лечении антибиотиками в течение 3 дней. Процесс лечения инфекций верхнего мочевыводящего тракта предполагает более длительный период.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH